

2021年9月改訂(効能・効果の変更に伴う改訂)

この添付文書は、本剤をご服用になる前に、かならずお読みください。
また、ご服用になる間は、いつでも読めるよう保管しておいてください。

冷え症、めまい、耳鳴り、月経不順、むくみ、更年期障害

とう き しゃく やく さん

漢方製剤

てんぐ 当帰芍薬散(顆粒)

第2類医薬品

てんぐ当帰芍薬散(顆粒)は、漢方処方の当帰芍薬散の配合比率にしたがって6種の生薬末に結合剤(デンプン・ハチミツ)を加えて顆粒剤とした漢方製剤です。

本剤は、冷え症で貧血の傾向があり、疲れやすい方の月経痛、頭重、めまい、肩こり、耳鳴り、むくみなどに用いられます。



使用上の注意

相談すること



- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 胃腸の弱い人。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感
- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合も服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

<効能・効果>

体力虚弱で、冷え症で貧血の傾向があり疲労しやすく、ときに下腹部痛、頭重、めまい、肩こり、耳鳴り、動悸などを訴えるものの次の諸症：月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、産前産後あるいは流産による障害（貧血、疲労倦怠、めまい、むくみ）、めまい・立ちくらみ、頭重、肩こり、腰痛、足腰の冷え症、しもやけ、むくみ、しみ、耳鳴り

<用法・用量>

次の1回量を1日3回、白湯又は常水にて通常食間に服用して下さい。

食間とは・・・食後2～3時間を指します。

年 齢	1 回 量
成 人(15歳以上)	1 包
7～14歳	2／3包
7歳未満	服用しないこと

用法・用量についての注意

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

<成分・分量>

1日量3包(4.8g) 中

トウキ末……………614mg

センキュウ末……………614mg

シャクヤク末……………818mg

タクシャ末……………818mg

ブクリョウ末……………818mg

ビャクジュツ末……………818mg

添加物としてコメデンプン、ハチミツを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し2日以内に服用して下さい。

※ 本剤は天然物（生薬）を用いていますので、原料の相違により顆粒の色が多少異なることがあります。効果に変わりありません。

お問い合わせ先

二反田薬品工業株式会社 お客様相談室 TEL 0823-31-1515
受付時間：9時から17時まで（土、日、祝日を除く）

製造販売元

二反田薬品工業株式会社
〒737-0845 広島県呉市吉浦新町2丁目5番2号